

## **Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta**

### **Bronchosol Solid**

tabletki powlekane

*Thymi herbae extractum siccum et Primulae radices extractum siccum*

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli podczas stosowania produktu leczniczego objawy utrzymują się lub jeśli wystąpią działania niepożądane nie wymienione w ulotce dołączonej do opakowania, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

### **Spis treści ulotki**

1. Co to jest lek Bronchosol Solid i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Bronchosol Solid
3. Jak przyjmować lek Bronchosol Solid
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Bronchosol Solid
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest lek Bronchosol Solid i w jakim celu się go stosuje**

Bronchosol Solid jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w kaszlu związanym z przeziębieniem.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonym wskazaniu wynikającym wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Bronchosol Solid jest przeznaczony do stosowania u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

#### **2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Bronchosol Solid**

##### **Kiedy nie przyjmować leku Bronchosol Solid:**

- jeśli pacjent ma uczulenie na tymianek lub korzeń pierwiosnka, inne rośliny z rodziny *Lamiaceae* lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

##### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bronchosol Solid należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej plwociny należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zapaleniem żołądka lub chorobą wrzodową żołądka.

Jeśli objawy nasiliły się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem.

### **Dzieci**

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostało ustalone ze względu na brak odpowiednich danych.

### **Inne leki i Bronchosol Solid**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bezpieczeństwo podczas ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone.

Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### **Lek Bronchosol Solid zawiera glukozę i sól**

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletkce powlekanej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

## **3. Jak przyjmować lek Bronchosol Solid**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

### **Zalecana dawka:**

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 tabletkca 3 razy na dobę.

### **Pacjenci z niewydolnością nerek i/lub wątroby**

Brak danych dotyczących dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek i/ lub wątroby.

### **Sposób podawania**

Podanie doustne.

### **Czas stosowania**

Jeśli w trakcie stosowania leku objawy nie ustępują w ciągu 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

### **Stosowanie u dzieci**

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

### **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bronchosol Solid**

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

### **Pominięcie przyjęcia leku Bronchosol Solid**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i nudności. Częstotliwość nie jest znana.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309,

strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać lek Bronchosol Solid**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenie na blistrze: Lot - numer serii, EXP – termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek Bronchosol Solid**

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka.

Jedna tabletkowa powleczona zawiera:

- 75 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z *Thymus vulgaris* L. lub *Thymus zygis* L., herba (ziela tymianku) (6-10:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) i 37, 5 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z *Primula veris* L. lub *Primula elatior* Hill., radix (korzenia pierwiosnka) (3,5-4,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda

Pozostałe składniki to:

- glukoza ciekła suszona rozpyłowo
- krzemionka koloidalna bezwodna
- celuloza mikrokrystaliczna

- kroskarmeloza sodowa
- stearylofumaran sodu
- hypromeloza
- dwutlenek tytanu
- talk
- hydroksypropyloceluloza
- makrogol 3350

**Jak wygląda lek Bronchosol Solid i co zawiera opakowanie**

Każde opakowanie zawiera 20 białych do jasnożółtych, gładkich, okrągłych, dwuwypukłych tabletek powlekanych w blistrach z folii PVC/PVDC-Aluminium.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Phytopharm Kłęka S.A.  
Kłęka 1  
63-040 Nowe Miasto nad Wartą  
Polska  
Tel.: + 48 61 28 68 000  
Fax: + 48 61 28 68 529  
info@europlant-group.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Bronchovit Filmtabletten

**Data ostatniej aktualizacji ulotki:**